


- Storia familiare di cancro colon-rettale
- Poliposi familiare (FAP) e sindromi correlate
- Cancro del colon ereditario non poliposico (HNPCC)
- Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali (MICI)
- Storia clinica di tumori della mammella, ovarico o endometriale

L'importanza dei fattori ambientali è provata dall'osservazione che il rischio di sviluppare un CRC negli individui che migrano da una regione a bassa incidenza per questa neoplasia verso una regione ad alta incidenza, aumenta fino a raggiungere i livelli del luogo di arrivo. **Tab.2**



Tab. 2

Tra i fattori ambientali e stili di vita hanno importanza determinante:

- Sovrappeso, vita sedentaria
- Dieta ipercalorica
- Eccessivo consumo di grassi di origine animale
- Dieta povera di vegetali e di scorie


- ✓ Family history of colorectal cancer
- ✓ Family polyposis (FAP) and related syndromes
- ✓ Hereditary nonpolyposis colon cancer (HNPCC)
- ✓ Inflammatory bowel disease (IBD)
- ✓ A history of breast, ovarian or endometrial cancer


The importance of environmental factors is proved by the observation that the risk of developing CRC in individuals migrating from a country of low

incidence for this cancer towards another one with a high incidence, increases to the levels of their place of arrival. **Tab.2**

The most important environmental and lifestyle factors are:

- Overweight, sedentary lifestyle
- High-calory diet
- Excessive consumption of animal fats





CI SIAMO ANCHE NOI... NON DIMENTICATECI!
—
WE ARE HERE TOO... DON'T FORGET US!

